## 【投薬】

5 1 2 ジピリダモール製剤 (ワーファリンとの併用による心臓弁置換術後 の血栓・塞栓の抑制の患者以外) の算定について

《令和7年4月30日》

## 〇 取扱い

ワーファリンとの併用による心臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑制の患者以外における次の傷病名に対するジピリダモール製剤(ペルサンチン錠 100mg)単独の算定は、原則として認められない。

- (1) 狭心症
- (2) 心筋梗塞(急性期を除く)
- (3) その他の虚血性心疾患
- (4) うっ血性心不全

## 〇 取扱いを作成した根拠等

ジピリダモール製剤(ペルサンチン錠 100mg)は、抗血小板作用をはじめ、 血栓・塞栓抑制作用、尿蛋白減少作用、腎機能改善作用を有する医薬品であ るが、添付文書の効能・効果は「ワーファリンとの併用による心臓弁置換術 後の血栓・塞栓の抑制」、「次の疾患における尿蛋白減少:ステロイドに抵 抗性を示すネフローゼ症候群」である。

以上のことから、ワーファリンとの併用による心臓弁置換術後の血栓・塞栓の抑制の患者以外における上記傷病名等に対するジピリダモール製剤(ペルサンチン錠 100mg)単独の算定は、原則として認められないと判断した。